

# ბიომინ რკინა

სასუქი ხელატური მინერალების შემცველობით

5-0-0

## ინფორმაცია პროდუქტზე

**ბიომინ რკინა** შეიცავს აზოტს და ხელატირებულ რკინას. გამოიყენება, როგორც ნიადაგიდან, ასევე ფოთლიდან შესატანად. **ბიომინ რკინა** დამზებულია ორგანულ წარმოებაში და არ არის მცენარისათვის ფიტო-ტოქსიკური, თუ დაცულია გამოყენების ნორმები. **ბიომინ რკინა** შექმნილია იმისთვის, რომ მოახდინოს რკინის დეფიციტის პრევენცია და გააძლიეროს მცენარე კრიტიკული ზრდის პროცესში. შესაძლებელია აზოტის შემცველ სასუქებთან გამოყენება.

### შემადგენლობა

საერთო აზოტი (N).....5.0%  
5% წყალში ხსნადი აზოტი  
რკინა (Fe).....18.0%  
18% ხელატირებული რკინა

**მძიმე მეტალები:** დარიშხანი(As)<3.0; კადმიუმი(Cd)<3.0; რკინა(Pb)<3.0; ვერცხლისწყალი(Hg)<0.2

## მოარიდეთ ბავშვებს!

საუკეთესო საშუალება მცენარეში რკინის დეფიციტის აღმოსაფხვრელად

პესტიციდთან ან სხვა სასუქთან შერევაში  
გთხოვთ შეამოწმოთ თავსებადობა

წონა: 25 ფუნტი (11.3 კგ)  
პარტიის ნომერი:  
რეგისტრაციის ნომერი/თარიღი:  
დამზადების თარიღი/ ვარგისია:



## რეკომენდაციები

### ნიადაგზე შესატანად:

**ბიომინ რკინა** შესაძლებელია გამოიყენოთ ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურებში, დათესვამდე, ან დათესვის პერიოდში. სარწყავი წყლის მუშეობით, საშუალო დოზა არის 1.7 – 5.6 კგ/ჰა. დოზა დამოკიდებულია სათეს კულტურაზე, ნიადაგის მდგომარეობასა და შეტანის მეთოდზე. მოვლის პერიოდში საშუალოდ რეკომენდირებული დოზა არის 1.7 კგ/ჰა.

### ფოთლოვანი გამოყენება:

#### მარცვლული კულტურები:

(ბორბალი, ქერი, სიმინდი): გამოიყენება ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურაში. გამოიყენეთ 1.1-1.7კგ/ჰა **ბიომინ რკინა** როდესაც მცენარის სიმაღლე მიალწევს 15-30 სმ. ან როდესაც გამოვლინდება რკინის დეფიციტის სიმპტომები. გაიმეორეთ 2-4 კვირის ვადაში.

**ბოსტნეული:** გამოიყენეთ 1.1-1.7 კგ/ჰა **ბიომინ რკინა** აღმოცენებამდე 2-4 კვირის ვადაში ან მაშინ როდესაც გამოვლინდება რკინის დეფიციტის სიმპტომები. გაიმეორეთ 2-3 კვირის შემდგომ.

#### სასათბურე კულტურები:

გამოიყენეთ 1.1-1.7 კგ/ჰა **ბიომინ რკინა** აღმოცენებიდან 2-3 კვირის ვადაში, გადარგვის შემდგომ ან მაშინ როდესაც გამოვლინდება რკინის დეფიციტის სიმპტომები. გაიმეორეთ ყოველ 1-2 კვირაში.

**ხეილი და ვაზი:** გამოიყენეთ 1.1-1.7 კგ/ჰა **ბიომინ რკინა** ადრეულ გაზაფხულზე ახალი ფოთლების აღმოცენების ფაზაში ან მაშინ როდესაც გამოვლინდება რკინის დეფიციტის სიმპტომები. გაიმეორეთ 2-4 კვირის შემდეგ.

ოფიციალური დისტრიბუტორი საქართველოში: შპს "აგროტექნოლოგიები", თბილისი, ვ.შოჭორობის ქ. 1-37 ტელ.: +995 568 451 818 ; +995 577 259 919 ელ.ფოსტა: info@agro-tech.ge; ვებ-გვერდი: [www.agro-tech.ge](http://www.agro-tech.ge) დამზადებულია ამერიკაში, ჯეიბი ბიოტექ ინკ-ის (JH Biotech Inc.) მიერ.

საუკეთესო შედეგის მისაღწევად გამოიყენეთ **ბიომინ რკინა** მცენარის აქტიური ზრდის ფაზაში მორწყვის ან წვიმის შემდგომ. ფოთლიდან შეტანის შემთხვევაში 1 კგ. **ბიომინ რკინა** გაზაფხუთ მინიმუმ 200 ლიტრ წყალში.

### უსაფრთხოების ზომები

არ გადაყლაპოთ. გამოყენების შემდეგ კარგად დაბანეთ ხელები. გადაყლაპვის შემთხვევაში საჭიროებს სამედიცინო მეთვალყურეობას, თუ თავს ცუდად იგრძნობთ, მიმართეთ ექიმს.. ჩამოიბანეთ პირი.

შეინახეთ უსაფრთხო, კარგად ვენტილირებად ადგილას. არ გადახურეთ ან გაყინოთ. მორაიდეთ შვის სხივებს. შეინახეთ მკიდრად დახურული, ორიგინალ შეფუთვაში. გამოყენების შემდეგ კონტეინერი გადაადგეთ ადგილობრივი კანონმდებლობის მიხედვით.

მწარმოებელი: ჯეიბი ბიოტექ ინკ-ის (JH BIOTECH, INC.) მიერ.  
805-650-8933 [jhbiotech.com](http://jhbiotech.com)