

წონა
833

verio® CaB

ვერნო CaB

სასუქი საკვები მიკროელემენტებით

ბორი (B) 90 გ/კვ (9%)
კალციუმი (Ca) 160 გ/კვ (16%)

წყალში დისპერსიული & უმტვერო გრანულები, მიკრონუტრიენტების ნაკლებობის აღმოსაფხვრელად

ვერნო CaB არის მიკროელემენტური სასუქი, რომელიც შედგება მიკრონიმირებული ნაწილაკებისგან, რომლებიც ძლიერად ეკვრის მცენარეთა ზედაპირებს. ნაწილაკები მოქმედებენ როგორც რემედიაციის საკვები ნივთიერებებისთვის ნელი გამოშვებით უზრუნველყოფს მინერალურ კვებას დროთა განმავლობაში. გამოიყენება მხოლოდ იქ, სადაც არის ამის საჭიროება. არ გადააბარებთ რეკომენდებულ დოზებს.

გამოყენების რეკომენდაცია ფოთლოვანი გამოკვებისთვის:

ხორბალი	1 - 2 კვ/ჰა მორე ფოთლის გამოღებიდან, სანამ მორე მუხლი არ იქნება ხილული (31 ზრდის ფაზაში)
რატისი	1 - 3 კვ/ჰა 4-9 ფოთლის სტადიაზე (BBCH 14-19) დროს გახანგრძლივება (BBCH 30) და ყვავილის ფურცლების დაყვება (BBCH 67)
კარტოფილი	1 - 2 კვ/ჰა სრული აღმოცენებიდან დაახლოებით 14 დღის შემდეგ (BBCH 09), გაიმეორეთ 14 დღის შემდეგ
ხეილი	1 - 3 კვ/ჰა ვარდისფერ კვირტზე, ყვავილობის დასაწყისში და ფოთლების ცვენამდე
ჭარხალი	1 - 2 კვ/ჰა 4-6 ფოთლის სტადიაზე, საჭიროების შემთხვევაში გაიმეორეთ 14 დღის შემდეგ
სოიო, პარკოსნები	1 - 2 კვ/ჰა 4-6 ფოთლის სტადიაზე, საჭიროების შემთხვევაში გაიმეორეთ 14 დღის შემდეგ
ციტრუსი	1 - 3 კვ/ჰა ყვავილობამდე და ყვავილობის პერიოდში
ვაზი	1 - 2 კვ/ჰა ყვავილობამდე და ყვავილობის პერიოდში
ალუბალი	1 - 3 კვ/ჰა ყვავილის კვირტიდან ყვავილობამდე და ადრეული მოსავლის აღების შემდეგ

გამოყენების ინსტრუქცია:

ავსეთ ავზი 3/4 წყლით და შეურიეთ შესაბამისი დოზა. გამოყენებისას შეაჩვრიეთ/მოურიეთ. ჰექტარზე გამოიყენეთ 200-1000 ლიტრამდე წყალი. წყლის რაოდენობა დამოკიდებულია შესასუქრებელი აპარატის მოზამზე. **პროდუქტი არ კლასიფიცირდება რეგულაცია (EC) 1272/2008 (CLP) მიხედვით.**

თავსებადობა სხვა პროდუქტთან:

ვერნო CaB არის თავსებადი სხვა ვერნოს ფორმულაციის პროდუქტებთან, რომელიც ნარმობულია ნორდოქს ახ-ს მიერ. ავზში სხვადასხვა პროდუქტის არევა რეკომენდირებული არაა, თუ წარმოების მიერ არ არის რეკომენდაცია განკუთვნილია რომელიმე პროდუქტზე. როდესაც მისასუქრებელი პროდუქტის pH არის 6 მე ნაკლები, ამ შემთხვევაშიც პროდუქტის არევა არ არის რეკომენდირებული. თუ მინიმუმ გადანაცვით პროდუქტთან არევის, მაშინ მიხედვით უნდა გაისინას ვერნო Mn34. თუ ნაღვემა გაქვდა მისასუქრებელი აპარატი, დუყუფუნებელ შეწყვიტეთ მისი გამოყენება. ზოგადად უსაფრთხოებისთვის, სასურველია თუ ჯერ მცირე მასშტაბზე გამოიყენებთ პრეპარატს და შეაფასებთ მცენარის ამტანობას კონკრეტული სასუქის მიმართ. მცენარის დაზიანება/ფიტოტოქსიკურობა ვლინდება 2 დღის ვადაში.

შენახვის პირობები

შენახვის ვადა 3 წელი (წარმოებიდან), თუ ის შენახულია მშრალად, დელოქულ ორიგინალ შეფუთვაში. უძლეებს ყინვას.

უსაფრთხოების მომები:

მოარიდეთ ბავშვებს. მოხმარებისას გამოიყენეთ სპეც ალტერნატივა (დამცავი სათვალე, ხელთათმანები, ტანსაცმელი), ცარიელი და სუფთა შეფუთვა გადაადგილო ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. დაუშვებელია გაზაფხული სასუქის ნარჩენის მდინარეებში, ტბებში და წყალსაცავებში გადასხმა. თუ ავზი ვერ დააყარეთ, დარჩენილ გაზაფხულ სასუქს დაუმატეთ 10-ჯერ მეტი წყალი და მიაკურნეთ ისევ მცენარეს.

მიზეზები:

დარიბისი (<20 გ/ლ) <40 გ/ლ (მაქს.)
ტყეა (<5 გ/ლ) <120 გ/ლ (მაქს.)
კადმიუმი (<1 გ/ლ, გამოშვებული) <3 გ/ლ (მაქს.)
ნიკელი (<1 გ/ლ, გამოშვებული) <100 გ/ლ (მაქს.)
ვერცხლისწყალი (<1 გ/ლ, გამოშვებული) <1 გ/ლ (მაქს.)

დამზადების თარიღი/prod.date

იხტარაზე/ see packaging
პარტიის ნომერი/lot number:
იხტარაზე/ see packaging
სახელმწიფო რეგისტრაცია/State registration:
XXX

წარმოებულა:
ნორდოქს ახ-ის მიერ
Øststensjøveien 13, 0661
ოსლო, ნორვეგია
ტელ: +47 22975000
www.nordox.no

ოფიციალური დისტრიბუტორი
საქართველოში:
შპს "ორაგრო"
ანა პოლიტკოვსკაია 4გ/103
ტელ: 568 45 18 18



წარმოებულა
ნორვეგიაში

