

აკონტროლებს შემდეგ დაავადებებს






- ფოთლის სიხუჭუჭე (*Taphrina deformans*) – ფოთლების დაავადება
- ყვავილელების მონილიოზური ჭკნობა (*Monilia laxa*) – ყვავილელების დაავადება
- დაფაცხავება (*Coryneum beijrinckii = Stigminia carpophila*) – ფოთლების, ტოტების და ნაყოფის დაავადება
- ყავისფერი სიდამპლე (*Monilia fructigena, M. laxa*) – ნაყოფის დაავადება

რეკომენდაციები: თირამ გრანუფლო 2-3კგ/ჰა

- ფოთლის სიხუჭუჭე (*Taphrina deformans*) – შეწამლა ფოთლის კვირტის გახსნის დროს;
 - ყვავილელების მონილიოზური ჭკნობა (*Monilia laxa*) – შეწამლა 5-10% ყვავილელების გახსნისას;
 - დაფაცხავება (*Coryneum beijrinckii = Stigminia carpophila*) – შეწამლა ვარდისფერი კვირტის ფაზაში;
 - ყავისფერი სიდამპლის (*Monilia fructigena, M. laxa*) წინააღმდეგ წამლობა
- ატამი, გარგარი 42 დღისა მოსავლის აღებამდე;
ალუბალი, ქლიავი 14 დღე მოსავლის აღებამდე;

ალუბალი, ქლიავი: ბოლო შეწამლა არა უგვიანეს 14 დღისა მოსავლის აღებამდე

ატამი, გარგარი: ბოლო შეწამლა არა უგვიანეს 42 დღისა მოსავლის აღებამდე

				
ფოთლის კვირტის გახსნა	ვარდისფერი კვირტი	ყვავილობის დაწყება	ყვავილეებიდან ფურცლების ცვენა	მოსავლის აღება

თირამ გრანუფლო® 80 წზგრ-თი შეწამლის პერიოდები

