



წამლობის სქემები

ყურძენი

თირამ გრანუფლო® 80 წზგრ-ს გამოყენება ყურძნის ნაცრისფერი სიდამპლის (Botrytis cinerea) წინააღმდეგ შესხურებებში, რაოდენობით 3-4კგ/ჰა-ზე



თირამ გრანუფლო® ეფექტურია აგრეთვე სიდამპლის სხვა შტამების მიმართაც, რომლებმაც მთლიანად ან ნაწილობრივ დაკარგეს მგრძობელობა სხვა ფუნგიციდების მიმართ.

თირამ გრანუფლო® გამოიყენება დამოუკიდებლად და აგრეთვე ნარევის სახით სხვა ფუნგიციდებთან ერთად.



თირამ გრანუფლო® რეგისტრირებულია სხვადასხვა ქვეყნებში: ეროპაში, აშშ, კანადა, იაპონია, ავსტრალია, ახალი ზელანდია, სამხრეთ აფრიკა. ასევე ამქვეყნებში განსაზღვრულია მოქმედი ნივთიერების ნარჩენის მაქსიმალური დასაშვები დონე.

ლოდინის პერიოდი მოსავლის აღებამდე ბოლო შეწამლიდან შეადგენს 35 დღეს.

თირამ გრანუფლო® არ მოქმედებს უარყოფითად ყურძნის წვენი ფერმენტოზაციაზე ღვინის დაყენების დროს.

რეკომენდაციები გამოყენებისათვის:

თირამ გრანუფლო®-ს გამოყენება რეკომენდებულია A, B, და C ფაზებში (მაგრამ მოსავლის აღებამდე არა უგვიანეს 35 დღისა) 4 ჯერადად. C ფაზაში, ეფექტურობის გასაზრდელად რეკომენდებულია თირამის კომბინაცია სხვა პრეპარატებთან. D ფაზაში შეწამლა საჭიროა მოსავლის აღებამდე 35 დღით ადრე.



ფაზები

კვირტების განცალკევება	ყვავილობა	ყვავილედიდან ქუდების ცვენა	მცირე ზომის მარცვალი	მარცვლების შეკვრა	მარცვლებში წვენის ჩადგომა	სიმწიფეში შესვლა	მოსავლის აღებამდე 35 დღით ადრე
------------------------	-----------	----------------------------	----------------------	-------------------	---------------------------	------------------	--------------------------------

