




## თირამ გრანუფლო<sup>®</sup>-ს გამოყენება ციტრუსებში

მოქმედებს შემდეგი დაავადებების წინააღმდეგ:

- ციტრუსის ქეცი (*Elsinoe fawcettii*, *Sphaceloma fawcettii*) – ფოთლებისა და ნაყოფის დაავადება
- ანტრაკნოზი (*Colletotrichum gloeosporioides*, *Glomerella cingulata*) – ყვავილეებისა და ნაყოფის დაავადება, როგორც ნაყოფის ზომის პერიოდში, ასევე მისი შენახვის დროს

რეკომენდაციები:

- თირამ გრანუფლო<sup>®</sup> 80 წზგ - 2-3კგ/ჰა, 4 შესხურება;
- ქეცი - პირველი შესხურება რეკომენდებულია ადრე გაზაფხულზე, როდესაც მცენარე იწყებს პირველ ვეგეტაციას. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ბაღებში, რომლებიც წინა წელს იყო ინფიცირებული.
- ანტრაკნოზი - პირველი შესხურება ყვავილობის დაწყებისას.
- თირამ გრანუფლო<sup>®</sup>-ს გამოყენება შესაძლებელია ყვავილობის პერიოდშიც, იგი არ არის ფიტოტოქსიკური ყვავილეების მიმართ და არ წარმოადგენს საფრთხეს ფუტკრებისათვის.
- რეკომენდებულია აგრეთვე საშემოდგომო შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ, რათა შევსწიროთ ფოთლების, ტოტების და დარჩენილი (დაზიანებული) ნაყოფების ინფიცირება სოკოს სპორებით ზამთრის პერიოდში.

მანდარინი, ფორთოხალი, ლიმონი, გრეიფრუტი				
			სოკოს სპორებით ინფიცირების შემცირება ზამთრის პერიოდში	
ადრე გაზაფხულზე, როდესაც პირველი ვეგეტაცია 25% აღწევს	ყვავილობის დაწყება	ყვავილეებიდან ფურცლების ჩამოცვენა	ნაყოფების ზომა 1-1.5სმ	მოსავლის აღების შემდეგ

თირამ გრანუფლო  
80 წზგ

