

სინერჯაიზერი® 5-10-20 ვაზი

SYNERGIZER® 5-10-20 Grape

თხევადი სასუქი

შემადგენლობა:

- აზოტის საერთო შემცველობა (N)-----5%
- 5% ამიაკალური აზოტი
- ათვისებადი ფოსფორმჟავა (P₂O₅)-----10%
- კალიუმის ხსნადი ნაერთი (K₂O)-----20 %

1 ლიტრი/Liter

მიღებულია ამონიუმის ფოსფატიდან, კალიუმის კარბონატიდან და კალიუმის ფოსფატიდან. ასევე შეიცავს ლეონარდიტისაგან მიღებულ ჰუმინურ მჟავებს 0.3%-ის ოდენობით.

ყურადღებით გაეცანით უსაფრთხოების წესებს და გამოყენების რეკომენდაციებს!

გამოყენების წინ კარგად შეანჯღრიეთ!

„სინერჯაიზერი® 5-10-20 ვაზი“ შესაძლოა გამოყენებულ იქნას ფოთლიდან გამოსაკვებად ან/და ნიადაგში შესატანად ერთი და იგივე დოზებით. „სინერჯაიზერი® 5-10-20 ვაზი“ უნდა გაზავდეს წყლის საკმარის რაოდენობაში მოცემული ფართობის დასაფარად.

კულტურა	სასუქი ლ/ჰა	რეკომენდაციები
ვაზი ყველა ჯიშის	2.5-5.0	3-4-ჯერ სეზონის განმავლობაში
კარტოფილი	2.5-5.0	3-4-ჯერ სეზონის განმავლობაში ტუბერების ფორმირების დაწყებიდან
სოიო	2.5-5.0	2-4-ჯერ, პირველი სრული ფოთლის ფორმირებისა და პარკების შევსების ადრეულ ეტაპებზე
მარწყვი, ჟოლო	2.5-5.0	2-3-ჯერ სეზონის განმავლობაში
ლობიო, ბარდა	2.5-5.0	3-4-ჯერ სეზონის განმავლობაში
ჭარხალი, სტაფილო	2.5-5.0	ბოლქვის წარმოქმნის დაწყებიდან
ყველა სახის კომბოსტო	2.5-5.0	3-4-ჯერ სეზონის განმავლობაში თავის ჩახვევიდან
ფოთლოვანი ბოსტნეული	2.5-5.0	3-4-ჯერ პირველი სრული ფოთლის ფორმირებიდან 3-4 კვირის ინტერვალით
ნესვი, გოგრა	2.5-5.0	2-3-ჯერ 3-4 კვირის ინტერვალით. პირველი შესხურება ტარდება ყვავილობამდე
ხახვი, ნიორი	2.5-5.0	3-4-ჯერ ბოლქვის წარმოქმნის დაწყებიდან
პომიდორი	2.5-5.0	1-3 ჯერ 3-4 კვირის ინტერვალით. პირველი შესხურება ტარდება ყვავილობამდე

დამუშავებულ ფართობებზე ხელით და მექანიზებული საშუალების დასაწყებად **ლოდინის პერიოდი - 0 დღე.**

არათავსებადი კალიუმის შემცველ პროდუქტებთან. თავსებადია უმეტეს თხევად სასუქებთან და პესტიციდებთან.

ზრდის ხილის ზომას 10-20%-ით და კულტურის გამძლეობას დაავადების მიმართ 15-25%-ით.

უსაფრთხოების ზომები: აუცილებელია სასუქთან მომუშავე პირებისათვის პირადი დაცვის საშუალებების გამოყენება: დამცავი ტანსაცმელი, წყალგაუმტარი ხელთათმანები, დამცავი სათვალე, პირბადე ან რესპირატორი. დახურულ სივრცეში (სათბურში) დამატებითი დამცავი ნიღაბი.

სასუქთან მუშაობის დროს აკრძალულია თამბაქოს მოწევა, სითხის და საკვების მიღება.

საშიშროების კლასი WHO-ს მიხედვით: არ არის კლასიფიცირებული, როგორც საშიში. თვალთან ან კანთან კონტაქტმა შესაძლოა გამოიწვიოს გაღიზიანება. მომწმველია გადაყლაპვისას.

პირველი დახმარების ზომები

შესუნთქვა: მოერიდეთ ზემოქმედების წყაროს. საჭიროების შემთხვევაში მიაკითხეთ ექიმს.

კანთან კონტაქტი: დაიბანეთ კარგად საპნით და წყლით. საჭიროების შემთხვევაში მიაკითხეთ ექიმს.

თვალთან კონტაქტი: დაიბანეთ თვალები წყლის დიდ რაოდენობით, მინიმუმ 15 წუთი. დარწმუნდით, რომ ამოღებულია გაქვთ კონტაქტური ლინზები. საჭიროების შემთხვევაში მიაკითხეთ ექიმს.

გადაყლაპვა: გამოირეცხეთ პირის ღრუ დიდი რაოდენობა წყლით. გული ძალით არ აიროთ. საჭიროების შემთხვევაში მიაკითხეთ ექიმს.

შეინახეთ საკვები და სასმელი პროდუქტებისაგან მოშორებით, ბავშვებისათვის მიუწვდომელ, მშრალ და გრილ ადგილას ქარხნულ შეფუთვაში.

ხანძარსაშიშროების კლასიფიკაცია: არ კლასიფიცირდება (E)

სახელმწიფო რეგისტრაცია: № 406
State Registration: 30.12.2014

ოფიციალური დისტრიბუტორი საქართველოში:

შპს „აგროტექნოლოგიები“, თბილისი, ვ.ბოჭორიშვილის ქ. 1-37

ტელ.: +995 32 236 5246; +995 599 551 683; +995 577 259 919

ელ.ფოსტა: info@agrotech.com.ge; ვებ-გვერდი: www.agrotech.com.ge



მწარმოებელი და რეგისტრანტი:

JH Biotech, Inc., 4951 Olivas Park Drive, Ventura CA 93003 U.S.A.

Phone: +1 805 650 8933; Fax: +1 805 650 8942; www.jhbiotech.com



გამოშვების თარიღი /Production Date:

პარტიის ნომერი/Lot number: